

ときわ交配

アドミラル

病気に強く、果焼け少なく、
安定した果形と収量性で作り易い！

適作型 | ハウス栽培
1月～9月まき（加温・無加温）

特
性

○主枝雌花率は7月まきで20%程度、
1～2月まきで80～90%、各節1果成
り主体となる。

○**褐斑病・ウドンコ病に強く**べト病にも
比較的強い**ため薬剤散布が軽減でき、**
栽培後半まで安定した栽培が行える。

○草勢は中、子枝・孫枝とも安
定して発生する。

○果実肥大はスムーズで、収量の波は
小さく安定した収量となる。

○果実は21～22cmで、果色は濃緑、肩
こけ少なく、**秀品率が**高く、果焼け****
の発生も少ない。

○葉は緑色でやや小葉、受光態
勢の良い草姿となり**管理作業**
が行いやすい。



栽培の
ポイント

○台木は、ぞっこん、ときわGT-IIが適する。

○果実肥大が始まる頃より灌水は多めに行い、追肥は遅れないようにする。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。 本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087



株式会社 **ときわ研究場**

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594
□ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437

URL <https://tokiwa-cucumber.com/>