



ディソール

作 型

ハウス栽培(加温・無加温)
9月～3月まき。

特 性

- 主枝雌花率は、9月播種で20～40%程度、11月以降の播種では60～70%となる。各節1果成りが主体となる。
- ウドンコ病・かっぱん病に強く、べト病の発生も少なく、薬剤散布の軽減が可能となり、収穫後半まで安定した栽培が行える。
- 枝の発生は、側枝、孫枝とも安定して発生する。
- 果実肥大は早く、初期から多収となる。また低温下においても、順調に果実肥大するため最低夜温は、12～13℃(実温)で行う。
- 果実は21cm程度で果重100g前後となり、果色は極濃緑、肩こけ少なく秀品率高い。
- 葉は濃緑で中～小葉、受光態勢の良い草姿となり、管理作業が行いやすい。



栽 培 の ポ イ ン ト

- 果実肥大が早いので、初期に十分な樹勢を確保する。そのため主枝は、ベッド上40cm以上の高さより着果させる。
- 灌水、追肥はエテルノと同様に早いタイミングで行う。
- 仕立て方は、2～3本仕立て(主枝+子枝1～2本半放任)の摘芯栽培或いはつる下げ栽培が適します。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場** 本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087
TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

URL <https://tokiwa-cucumber.com/>

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 中部営業所 長野県上田市武石 TEL.0268-85-3560
□ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594 □ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437