

ときわ  
交配

ついに出了た！  
ときわの耐病性  
節成りキュウリ

耐  
病

光

こうか

華

複合耐病性、完全節成、  
衝撃の多収性！

適作型

ハウス栽培

2月～7月まき

1月～9月まき(暖地)

特 性

- ウドンコ病、褐斑病に強く、べと病にも比較的強いため、薬剤散布が軽減でき、栽培後半まで安定した栽培が行える。
- 草勢は中位、初期の成りこみが激しく子枝、孫枝の発生はゆっくりとなる。
- 果実肥大は早く、初期から多収となり、樹ボケの心配は少ない。また高温下においても順調に果実肥大し、尻細果の発生は少ない。
- 主枝雌花率は、7月播種で80～100%、各節1～2果成りが主体となる。
- 果実は22～23cmで、果色は極濃緑、肩こけ少なく秀品率高い。
- 葉は濃緑で中葉、受光態勢の良い草姿となり、管理作業が行いやすい。

栽培のポイント

- 台木は、「ぞっこん」、「ときわGT-II」が適する。
- 果実肥大が早いため、樹づくりが大切。果実の開花肥大に合わせてこまめな灌水を行うとともに追肥も積極的に行う。
- 8月定植の場合は、子枝は1節止めとし孫枝から半放任枝を残す。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場**

URL <https://tokiwa-cucumber.com/>

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594  
□ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437