

今までにない淡い緑色の果実が特徴、
家庭菜園でも楽しめる！

ときわ交配

うぐいす

C U C U M B E R

キュウリ

適作型

半促成・雨よけ・ハウス抑制
露地栽培用

3月～8月中旬まき（関東標準）

- 節成り性が高く、主枝雌花着果率は3月まきで60～70%、5月まきで50～60%、7月まきで30～40%。
低温期の側枝は節成りで各節とも2～1果成りである。
- 病害に強く、珍しいうぐいす色のキュウリで食味が良く産直などで他のきゅうりと差別化が図れる

栽培のポイント

着果数が多く初期から収量が多い為
早め早めの追肥が必要。また秀品率を
高める為にも早めの摘果と混み過ぎ
ないよう摘葉を行うことが重要となる。
側枝・孫枝の発生は旺盛なので適宜止
めていく。



 **株式会社 ときわ研究場**

本 社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

☎ 0493-54-1155 Fax.0493-54-1332

東北営業所 岩手県北上市 ☎0197-68-2840 中部営業所 長野県上田市武石 ☎0268-85-3560
福島営業所 福島県須賀川市 ☎0248-75-1594 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 ☎0985-73-3437